



## AYUDE A GARANTIZAR QUE RECIBA EL VALTOCO QUE LE RECETARON



### ¿QUÉ ES UNA FARMACIA ESPECIALIZADA MAXOR?



La farmacia especializada Maxor es una farmacia de servicio integral que puede surtir sus medicamentos recetados.



Una vez que la farmacia especializada Maxor reciba su receta, alguien de la farmacia lo llamará. La llamada procederá del número 1-866-629-6779. Es muy importante que responda esta llamada.

**No podrá recibir su receta de VALTOCO hasta que responda.**



La farmacia especializada Maxor confirmará su seguro y le indicará el precio final de su medicamento en el plazo de un día a partir de su pedido, a menos que su plan de seguro requiera más información.



Cuando se requiera autorización previa, la farmacia especializada Maxor iniciará el proceso de autorización y trabajará con su compañía aseguradora, su proveedor de atención médica y usted hasta que se complete el proceso de autorización.

### PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN:

Visite [www.MaxorSpecialty.com](http://www.MaxorSpecialty.com)

o llame al 1-866-629-6779

de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., hora del centro

### ¿Qué es VALTOCO® (espray nasal de diazepam)?

- VALTOCO es un medicamento de venta con receta utilizado para el tratamiento a corto plazo de los accesos convulsivos (también conocidos como "convulsiones repetitivas agudas") en pacientes de 6 años de edad o más.
- **VALTOCO es una sustancia controlada a nivel federal (CIV), ya que puede ser objeto de abuso o provocar dependencia.** Mantenga VALTOCO en un lugar seguro para evitar el uso incorrecto y el abuso. La venta o entrega de VALTOCO puede dañar a otras personas y va contra la ley. Informe a su proveedor de atención médica si ha consumido de forma abusiva o si ha tenido dependencia del alcohol, fármacos de venta con receta o drogas.
- Se desconoce si VALTOCO es seguro y eficaz en niños menores de 6 años.

Consulte la información de seguridad importante, incluida la advertencia especial en la parte posterior.

## ¿Qué es VALTOCO® (espray nasal de diazepam)?

- VALTOCO es un medicamento de venta con receta utilizado para el tratamiento a corto plazo de los accesos convulsivos (también conocidos como “convulsiones repetitivas agudas”) en pacientes de 6 años de edad o más.
- VALTOCO es una sustancia controlada a nivel federal (CIV), ya que puede ser objeto de abuso o provocar dependencia. Mantenga VALTOCO en un lugar seguro para evitar el uso incorrecto y el abuso. La venta o entrega de VALTOCO puede dañar a otras personas y va contra la ley. Informe a su proveedor de atención médica si ha consumido de forma abusiva o si ha tenido dependencia del alcohol, fármacos de venta con receta o drogas.
- Se desconoce si VALTOCO es seguro y eficaz en niños menores de 6 años.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

### Información importante de seguridad que debe conocer sobre VALTOCO® (espray nasal de diazepam), CIV

#### ¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre VALTOCO?

- VALTOCO es un medicamento benzodicepínico. Tomar benzodicepínicos con opioides, alcohol u otros depresores del sistema nervioso central (incluidas las drogas) puede causar somnolencia extrema, problemas respiratorios (depresión respiratoria), coma y muerte.
- VALTOCO puede hacer que sienta sueño o mareos, y puede ralentizar el razonamiento y las habilidades motoras. No conduzca, use maquinaria pesada ni realice otras actividades peligrosas hasta que sepa cómo lo afecta VALTOCO.
- Al igual que otros fármacos antiepilépticos, VALTOCO puede provocar pensamientos o acciones suicidas en una cantidad muy pequeña de personas, alrededor de 1 de cada 500. Llame a un proveedor de atención médica de inmediato si presenta alguno de estos síntomas, especialmente si es reciente, empeora o le preocupa:
  - Pensamientos sobre el suicidio o la muerte
  - Sentirse nervioso o inquieto
  - Actuar de forma agresiva, estar enfadado o violento
  - Intentos de suicidio
  - Crisis de angustia
  - Actuar respondiendo a impulsos peligrosos
  - Dificultad para dormir (insomnio)
  - Un aumento extremo de la actividad y de la conversación (manía)
  - Ansiedad nueva o agravada
  - Irritabilidad nueva o agravada
  - Otros cambios inusuales en la conducta o el estado de ánimo
  - Depresión nueva o agravada

#### ¿Cómo puedo detectar los primeros síntomas de pensamientos o acciones suicidas?

- Preste atención a cualquier cambio, especialmente a los cambios repentinos en el estado de ánimo, las conductas, los pensamientos o los sentimientos.
- Acuda a todas las visitas de seguimiento con su proveedor de atención médica según lo programado.
- Llame a su proveedor de atención médica entre las visitas, según sea necesario, especialmente si le preocupan los síntomas. Los pensamientos o las acciones suicidas pueden deberse a cosas distintas de los medicamentos. Si tiene pensamientos o acciones suicidas, su médico puede comprobar otras causas.

#### No utilice VALTOCO si:

- Es alérgico al diazepam.
- Tiene un problema ocular llamado glaucoma agudo de ángulo estrecho.

#### ¿Qué debo decirle a mi médico antes de recibir VALTOCO?

##### Antes de usar VALTOCO, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluido si:

- Tiene asma, enfisema, bronquitis, enfermedad pulmonar obstructiva crónica u otros problemas respiratorios.
- Tiene antecedentes de alcoholismo o drogadicción.
- Tiene antecedentes de depresión, problemas de humor o pensamientos o conductas suicidas.
- Tiene problemas hepáticos o renales.
- Está embarazada o planea quedar embarazada. VALTOCO puede dañar al feto.
- Está en período de lactancia o planea amamantar. VALTOCO pasa a la leche materna y puede dañar a su bebé. Hable con su proveedor de atención médica sobre la mejor manera de alimentar a su bebé si utiliza VALTOCO.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que reciba, incluidos los medicamentos de venta con receta y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.

#### ¿Cómo debo utilizar VALTOCO?

- Lea las instrucciones de uso para obtener información detallada sobre la forma correcta de utilizar VALTOCO.
- Use VALTOCO exactamente como se lo haya indicado el proveedor de atención médica.
- Su proveedor de atención médica le dirá:
  - Qué son los accesos convulsivos
  - La cantidad exacta de VALTOCO que debe administrarse
  - Cuándo administrar VALTOCO
  - Cómo administrar VALTOCO
  - Qué hacer después de administrar VALTOCO si las convulsiones no cesan o si hay un cambio en la respiración, la conducta o la afección que le preocupa
- Debe llevar VALTOCO con usted en caso de que necesite controlar sus accesos convulsivos.
- Los familiares, los proveedores de atención y otras personas que posiblemente tengan que administrar VALTOCO deben saber dónde guarda su VALTOCO y cómo administrar VALTOCO antes de que se produzca un acceso convulsivo.
- VALTOCO se administra solo en la nariz (por vía nasal).
- VALTOCO viene listo para usar.
- Cada espray de VALTOCO se utiliza 1 vez y no se puede reutilizar. **No** pruebe ni beba el espray nasal antes de usarlo.
- Cada dosis de VALTOCO se proporciona en un envase individual. Utilice todo el medicamento incluido en 1 envase para una dosis completa.

#### ¿Qué debo hacer después de administrar VALTOCO?

- Quédese con la persona después de administrar VALTOCO y vigílela atentamente.
- Mantenga o coloque a la persona de lado.
- Anote la hora a la que se administró VALTOCO.
- Llame a emergencias si se produce alguna de las siguientes situaciones:
  - La conducta convulsiva es diferente de otras convulsiones que la persona ha tenido.
  - Se alarma debido a la frecuencia con la que se producen las convulsiones, por la gravedad de la convulsión, por la duración de la convulsión, o por el color o la respiración de la persona.
- Descarte (deseche) el VALTOCO utilizado.

Si es necesario, se puede administrar una segunda dosis al menos 4 horas después de la primera dosis, utilizando un envase nuevo de VALTOCO. No administre más de 2 dosis de VALTOCO para tratar un acceso convulsivo.

**No** debe administrarse una segunda dosis si hay preocupación acerca de la respiración de la persona, si la persona necesita ayuda para respirar o tiene somnolencia extrema.

No use VALTOCO para más de 1 episodio de acceso convulsivo cada 5 días. No use VALTOCO para más de 5 episodios de accesos convulsivos en 1 mes.

#### ¿Qué debo evitar mientras uso VALTOCO?

- No beba alcohol ni tome medicamentos opioides que lo hagan sentir somnoliento o mareado mientras recibe VALTOCO hasta que hable con su proveedor de atención médica. Cuando se utiliza con alcohol o medicamentos que pueden causar somnolencia o mareos, VALTOCO puede intensificar la somnolencia o los mareos.

#### ¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes de VALTOCO?

Los efectos secundarios más frecuentes de VALTOCO incluyen, entre otros, los siguientes:

- Sentirse somnoliento o adormilado
- Dolor de cabeza
- Molestias en la nariz

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de VALTOCO. Llame a su proveedor de atención médica para obtener consejo médico sobre los efectos secundarios. Puede notificar los efectos secundarios a Neurelis, Inc. al 1-866-696-3873 o a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) al 1-800-FDA-1088.

**Consulte la ficha técnica (en inglés) en [www.valtoco.com](http://www.valtoco.com) y lea la guía del medicamento que la acompaña para obtener información adicional de seguridad importante.**

